

Cérience
L'AGRONOME SEMENCIER

PERDIX

SAINFOIN

DES PROTÉINES MÊME EN SOL CALCAIRE !





PERLY

Caractéristiques :

- Sainfoin
- Type double (remontant)

Date début floraison :

- Intermédiaire

Profil :

- Moyenne durée

Pérennité :

- 2 à 3 ans

Types de sol :

- Séchant calcaire

Dose (kg/ha) :

- 120 à 140 kg/ha (semences en cosses)

SES ATOUTS

• Une très bon potentiel de production même en conditions biologiques:

- PERDIX est issu d'une sélection visant à améliorer la vigueur d'installation et le rendement du sainfoin.
- C'est une variété de type double (remontante) offrant plusieurs coupes par an pour une production de fourrage même en été.
- Enfin, PERDIX a été partiellement sélectionné en conditions biologiques, ce qui sécurise ses performances en agriculture biologique.

• Un fourrage de grande qualité :

- Le sainfoin est une espèce non météorisante et très appétente pour les animaux.
- PERDIX se distingue notamment par sa richesse en feuilles et sa résistance aux maladies foliaires ⁽¹⁾.
- Une exploitation entre le stade début bourgeonnement et début floraison permet de maximiser la valeur nutritive du fourrage et la teneur en tanins condensés (4-10%) qui améliore l'assimilation des protéines (effet by-pass)

• Une amélioration des performances sanitaires et environnementales du troupeau :

- Chez les petits ruminants, l'incorporation de tanins dans la ration contribue à la maîtrise des strongles digestifs.
- La richesse en tanins du sainfoin pourrait contribuer à réduire les émissions de méthane.
- Le sainfoin est également une plante mellifère très appréciée des abeilles.

⁽¹⁾ Note à l'inscription en Suisse de 2.3 vs. une moyenne des variétés de 3.3. Attention, dans le système suisse de notation, plus la note est basse plus la variété est performante. 1 = très bon ; 9 = très mauvais.



HappyGRASS
Votre assistant prairie

HappyGrass est le bouquet d'application dédié à la gestion de vos prairies et du pâturage. Il contient de nombreux outils notamment pour :

- composer vos prairies, méteils et dérobées en fonction de vos objectifs et des caractéristiques pédoclimatiques de votre parcelle ;
- définir les besoins en fertilisation azotée ;
- visualiser les fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte ;
- saisir et valoriser vos données liées à la gestion du pâturage.

www.happygrass.fr

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Pâturage	Fauche

Semis (juillet-septembre ou mars-avril) :

- Choisir des parcelles avec un pH > 6.5, réaliser un apport d'amendement basique si nécessaire ;
- Préparer un sol fin en surface et bien rappuyé en profondeur ;
- Semer à une profondeur de 2 cm maximum ;
- Rouler juste après le semis.

Protection :


- Surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire ;
- Désherber à l'installation (dès le stade 3-4 feuilles trifoliées) si nécessaire (demander conseil à votre technicien).

Fertilisation :

- Veiller à compenser les exportations en phosphore et potassium (environ 5 kg P₂O₅/t M.S et 22 kg K₂O/ t M.S) en particulier si les teneurs du sol sont faibles.
- Tenir compte des restitutions apportées par les animaux en cas de pâturage.
- Le sainfoin est autonome en azote (légumineuse). En mélange, les apports sont à raisonner en fonction de la proportion de légumineuses dans la parcelle (pas d'apport si > 30%, sinon apport possible).



Conditionnement :
Sac de 25 kg



2021 • Document non contractuel.

Les informations contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédoclimatiques et culturales.

cerience
L'AGRONOME SEMENCIER

Route de la Ménitry - Beaufort-en-Vallée -
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr