


Chlorofiltre 31

COUVERT INTERCULTURE

Le Chlorofiltre® 31 convient dans les situations à faibles excédents azotés et peut être consommé.





Chlorofiltre 31

56% Avoine Rude **ALTESSE**
 36% Vesce commune Printemps **NACRE**
 8% Trèfle d'Alexandrie **TABOR**

Nombre de graines /m² : 155
Dose : 25 kg/ha
Cultures suivantes :
 - Cultures de printemps

Gamme :
 - Fertilité du sol

SES ATOUTS

• **Installation rapide et bonne couverture automnale**

L'avoine rude ALTESSE a été sélectionnée pour sa rapidité de couverture et sa capacité à s'installer rapidement. La vesce commune NACRE produit une biomasse importante à l'automne. Le trèfle d'Alexandrie TABOR produit une forte biomasse en semis estival. Cette complémentarité permet une couverture optimale et une biomasse importante.

• **Fertilité du sol améliorée grâce aux légumineuses**

Les légumineuses de ce mélange TABOR (trèfle d'Alexandrie mono-coupe) et NACRE (vesce commune) permettent une restitution rapide de l'azote. De plus, NACRE est une variété résistante à l'Aphanomyces ce qui permet une rupture parasitaire.

• **Destruction facile**

Nous avons sélectionné ces variétés pour leur facilité de destruction que ce soit par l'effet du gel ou par un simple broyage.



myCHLORofiltre®


L'application myChlorofiltre est un outil d'aide à la décision (OAD) dédié à la culture des couverts végétaux. Développée par Cérience, myChlorofiltre est la seule application permettant d'estimer la biomasse d'un couvert à partir de photos ; un outil innovant, simple à utiliser et gratuit !

Il contient 3 services complémentaires :

- Choisir mon couvert
- Réussir mon implantation
- Estimer ma biomasse

www.mychlorofiltre.fr

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Interculture courte	Interculture longue
	

Conseils d'implantation :


- Gérer les résidus de récolte
- Déchaumage superficiel de 3 à 5 cm maximum
- Semer entre 1 et 2 cm de profondeur
- Rouler pour assurer le contact graine-terre

Conseils de destruction :

- Gel
- Roulage ou broyage
- Mulching
- Chimique (selon la réglementation locale)
- A partir de 2,5 T de M.S. /ha
- De 40 à 60j avant l'implantation de la culture suivante



Conditionnement :
Sac de 25kg



2021 • Document non contractuel
Composition soumise à modification en fonction des disponibilités



Route de la Ménitry - Beaufort-en-Vallée -
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr