

Cérience

L'AGRONOME SEMENCIER

Chlorofiltre ELITE

COUVERT INTERCULTURE

Le Chlorofiltre® ELITE a une haute performance agronomique et une bonne complémentarité des espèces.



Chlorofiltre ELITE

65% Vesce Commune Printemps **NACRE**
15% Trèfle d'Alexandrie **TABOR**
20% Moutarde d'Abyssinie **CARBON***

Nombre de graines /m² : 153
Dose : 12 kg/ha | 15 à 20 kg/ha
semé en vigne (en plein soit
2g/m² semé)
Période de semis :
Juillet-Août avant ou après
vendange

Gamme :
- Structure du sol
Cultures suivantes :
Blé, pois, maïs, tournesol,
pomme de terre, betterave

SES ATOUTS

• Forte production de biomasse et effet structuration du sol

La vesce commune NACRE et le trèfle d'alexandrie mono-coupe TABOR ont une forte production de biomasse à l'automne. La complémentarité des espèces et des systèmes racinaires permettent un effet très positif sur la structuration du sol.

• Tardivité de la moutarde d'Abyssinie

Même avec une implantation en semis d'été, il n'y a pas de montée à graine. C'est une vraie différenciation par rapport aux moutarde blanches précoces.

• Très bon profil agronomique et bonne décomposition

Il y a une très bonne complémentarité des légumineuses et des crucifères. De plus, ces variétés sont facilement détruisible, que ce soit par roulage ou broyage.



myCHLORofiltre®

L'application myChlorofiltre est un outil d'aide à la décision (OAD) dédié à la culture des couverts végétaux. Développée par Cérience, myChlorofiltre est la seule application permettant d'estimer la biomasse d'un couvert à partir de photos ; un outil innovant, simple à utiliser et gratuit !

Il contient 3 services complémentaires :

- Choisir mon couvert
- Réussir mon implantation
- Estimer ma biomasse

www.mychlorofiltre.fr

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Interculture courte	Interculture longue

Conseils d'implantation :

- Gérer les résidus de récolte
- Déchaumage superficiel de 3 à 5 cm maximum
- Semer entre 1 et 2 cm de profondeur
- Rouler pour assurer le contact graine-terre

Conseils de destruction :

- Roulage ou broyage
- Mulching
- Chimique (selon la réglementation locale)
- A partir de 2,5 T de M.S. /ha
- De 40 à 60j avant l'implantation de la culture suivante

* Ne pas faire consommer la moutarde d'Abyssinie en fourrage comme à l'état de graine.



Conditionnement :
Sac de 25kg

Cérience
L'AGRONOME SEMENCIER

Route de la Ménitrie - Beaufort-en-Vallée –
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr

2021 • Document non contractuel
Composition soumise à modification en fonction
des disponibilités