



Cérience
L'AGRONOME SEMENCIER



AYACARA

RADIS FOURRAGER ANTI-NÉMATODES

**Résistances multiples aux nématodes
et à la hernie du chou**



AYACARA

CARACTÉRISTIQUES VARIÉTALES

Espèce : Radis fourrager

- Obtention : Vandinter/Cérieence
- Inscription : Allemagne 2022
- Floraison : tardive à très tardive
- PMG: 12 à 14 gr
- Dose de semis : 9 à 20 gr/ha en pur

Action :

- Nématicide
 - Hétérodéra schachtii (betterave) : BCA1
 - Meloidogyne chitwoodi (P.de terre, maïs): Résistant
 - Meloidogyne incognita (maïs,légumes): Résistant
- Hernie du chou : Résistant

SES ATOUTS

- Action nématocide très élevée contre les nématodes de la betterave (BCA1).
- Double résistance aux nématodes de la pomme de terre, maïs et légumes.
- Résistance à la hernie du chou.
- Floraison très tardive.
- Couverture de sol très rapide.


RÉSULTATS OFFICIELS

Catalogue Allemand des variétés de radis 2025

Variétés	Année inscription	Résistance vis-à-vis du nématode à kystes - H.schachtii	Résistance vis-à-vis du nématode à galles - M.chitwoodi	Vitesse de couverture du sol (1 = mauvais 9= très bon)	Tardivité à floraison (1 = très précoce 9= précoce)	* Résistance à la hernie du chou
AYACARA	2022	BCA 1	R	7	4	R
Témoin A	2018	BCA 2	R	5	3	/
Tajuna	2012	BCA 2	R	6	5	/
Témoin C	2015	BCA 2	R	6	4	/
Trident	2015	BCA 2	R	7	3	/
Mercator	2013	BCA 2	/	7	4	/

* Résistance à la hernie du chou = résultat test de la SNES (France)
BCA 1= réduction nématodes >99%

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Couvert	Plantes compagne colza
	

Conseils d'implantation :

- Gérer les résidus de récolte
- Déchaumage superficiel de 3 à 5 cm maximum
- Semer entre 1 et 2 cm de profondeur
- Rouler pour assurer le contact graine-terre



Conditionnement :
Sac de 25 kg